

## Case 2

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 52 ปี

CC : ตามัว 4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล

PI : 4 ปีก่อนผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการตามัวทั้งสองข้าง มาพบจักษุแพทย์ได้รับการรักษาโดย prednisolone จนการมองเห็นปกติดี ขณะติดตามการรักษาได้ทำ CXR พบ hilar enlargement จึงทำการตรวจเพิ่มเติม CT scan พบก้อนที่ต่อมหมวกไตด้านซ้ายจึงส่งมาพบอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ แต่ผู้ป่วยขาดการรักษา

1 ปีก่อนมารพ. ผู้ป่วยมีอาการตามัวลงทั้งสองข้าง พบจักษุแพทย์ได้รับการรักษาด้วย Prednisolone อาการดีขึ้น และส่งปรึกษาอายุรกรรมต่อมไร้ท่อเนื่องจากมีประวัติตรวจพบก้อนที่ต่อมหมวกไตด้านซ้าย 4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการตามัวลงทั้งสองข้าง จึงมาโรงพยาบาล

FH : ปฏิเสธโรคประจำตัวในครอบครัว

Personel history : ปฏิเสธการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์

Physical examination

Vital sign BP 130/90 mmHg, HR 94 bpm, BT 36.5 C

GA A woman, fully conscious, co-operative

HEENT :no round face, no facial plethora, no buffalo hump

not pale, anicteric sclerae

thyroid gland 15 g, normal

no cervical lymphadenopathy

Lung : clear

Heart : normal S1S2, no murmur

Abdomen : soft, no distension, no hepatosplenomegaly

Extremities : normal, no bruise

Neuro : grossly intact