

**Case2** ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 61 ปี อาชีพทำสวน

CC: ปวดท้อง 2 เดือน PTA.

PI: 7 เดือน PTA. อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย น้ำหนักลดลง 7 kg ไม่มีไข้ แพทย์บอกว่าเป็นโรคไทรอยด์ได้รับยา 2 ชนิด  
อาการดีขึ้น

4 เดือน PTA. มีอาการซ้ำอีกหลังหยุดยา กลับไปรับยาเดิมอาการดีขึ้นแต่สังเกตว่ามีปัสสาวะกลางคืนบ่อย

2 เดือน PTA. ปวดแน่นบริเวณลิ้นปี่ เป็นตลอดเวลา กินอาหารได้น้อยลง อ่อนเพลีย ญาติสังเกตว่าซึมลงและมีไข้

PH: วินิจฉัยเป็น schizophrenia เมื่ออายุ 49 ปี ได้รับยา perphenazine 4 mg และ artane 2 mg มาตลอด

FH: ไม่มีประวัติโรคภายในครอบครัว

#### Physical examination

GA: A middle-aged Thai female, acutely ill, dehydrated

V/S: BT 39.6 °C RR 24/min BP 90/60 mmHg, PR 120/min

Skin and appendages: no hyperpigmentation

HEENT: mildly pale conjunctiva, anicteric sclera

Abdomen: mild tenderness, normal bowel sound, no hepatosplenomegaly, no mass

Lymph node: left groin node 2-cm in diameter, firm consistency, not tender

Neurological examination: glossy intact, stuporous

#### Laboratory investigations

CBC: Hb 8.0 Hct 24.7 WBC 5,240 PMN 57% L 30% Eo 0.1% plt 162,000

Electrolyte: Na 161 K 4.8 Cl 113 HCO<sub>3</sub> 26, Ca 9.1, PO<sub>4</sub> 2.6

U sp.gr 1.002