

Case 2

ผู้ป่วยหญิงไทย โสัด อายุ 67 ปี อาชีพ แม่บ้าน ภูมิลำเนา จังหวัดกรุงเทพฯ

CC: น้ำหนักลดลง 6 กก. ในระยะเวลา 3 เดือน

PI:

- 7 ปี PTA ผู้ป่วยเคยชั่งน้ำหนักได้ 60 kg หลังจากนั้นน้ำหนักลดลงเรื่อย ๆ ประมาณปีละ 1-2 กก. รับประทานอาหารได้ตามปกติ
- 3 เดือน PTA ผู้ป่วยน้ำหนักลดลงจาก 46 kg เป็น 40 kg รับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนัก ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ไม่เบื่ออาหาร ไม่มีอาการท้องเสียเรื้อรัง ไม่มีอาการใจสั่นหรือหิวบ่อย ไม่มีไข้ มีคนทักว่าผอมลงมาก จึงมาตรวจที่โรงพยาบาล

Personal history:

- DM เป็นมาประมาณ 7 ปี: Glipizide (5) 1/2x1 po ac
- ปฏิเสธรับประทานยาต้ม ยาหม้อ ยาสมุนไพร และยาบำรุงอื่นๆ
- เคยผ่าตัดกระดูกต้นแขนซ้ายหักจากอุบัติเหตุเมื่อ 22 ปี

FH:

- มารดาเป็นเบาหวาน

Physical examination

BP 130/80 mmHg HR 84/min BT 36.8 °C RR 16/min

BW 40 kg Height 157 cm

GA: A Thai female, good consciousness, cachexia

HEENT: pale conjunctivae, anicteric sclerae, thyroid gland 15 g

Abdomen: soft, not tender, liver span 10 cm, no splenic dullness on percussion

Neuro: grossly intact

Extremities: no edema

Laboratory investigations

FPG 131 mg/dL HbA1C 6.7%

CBC: Hb 7.9 g/dL Hct 24.5% WBC 4500/uL (N 60.4% L 33.1%) Plt 302000

MCV 81.7 fL RDW 16.8%

Electrolytes: Na 137 mEq/L K 4.05 mEq/L Cl 105.4 mEq/L HCO₃ 22.1 mEq/L