

Case 2

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานธนาคาร ภูมิลำเนาจังหวัดบุรีรัมย์

Chief complaint: ตรวจพบความดันโลหิตสูง 1 ปีครึ่งก่อนมารพ.

Present illness: 1 ปีครึ่งก่อนมารพ. ไปติดตามการรักษา post-ablative hypothyroid ตรวจพบความดันโลหิตสูง ไม่มีปวดศีรษะ ไม่มีประวัติแขนขาอ่อนแรงหรือใจสั่น

Past and Personal History:

- U/D 1. Graves' disease Dx 2559 S/P I-131 ablation 2560 with hypothyroidism
2. DLP
- ปฏิเสธประวัติดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่

Physical Examination:

GA: normo-sthenic built, good consciousness, well co-operative, No cushingoid appearance

V/S: BT37 C, BP130/80 mmHg, PR 70 bpm, RR12 tpm BW 51.7 kg Ht 170 cm BMI 17.8

BP 4 extremity Rt upper extremity 132/78 mmHg, Lt upper extremity 130/80 mmHg

Rt lower extremity 138/84 mmHg, Lt lower extremity 140/86 mmHg

HEENT: pink conjunctiva. No icteric sclera. Thyroid gland 15 gm, no nodule

Heart: Equal pulse all extremity, PMI at 5th ICS MCL, No heaving, No thrill, Normal S1S2, No murmur.

Lungs: Clear and equal BS, No adventitious sound.

Abd: No distension, Soft, no tenderness, Liver spleen and kidney cannot be palpated. Bimanual palpation neg

Ext: No edema.

NS: grossly intact

Investigation:

CBC: Hb 14 g/dl Hct41% MCV 83 WBC13930 (PMN91%, Lym5.5%) Platelet 218000

BUN 10 mg/dl Cr 0.61 mg/dl, Na 138 mmol/L K 3.2 mmol/L, Cl 103 mmol/L, HCO₃ 28 mmol/L