

Interhospital Endocrine Conference

ครั้งที่ 4/2554

Case 2 : A 53 years old woman with type 2 diabetes presented with foot swelling

หญิงไทยคู่อายุ 53 ปี อาชีพ ขายปลาและของแห้งที่ตลาดศรียาน

อาการสำคัญ : เท้าชวาบวมมา 2 อาทิตย์ก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน : 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีประวัติเดินสะดบนลู่วิ่ง ไม่มีอาการเจ็บปวด

2 สัปดาห์ต่อมา สังเกตว่าเท้าเริ่มบวมขึ้น เวลาเดินมีอาการเจ็บเท้าเล็กน้อย

Case 4: A 56 years old woman presented with gradual enlargement of thyroid goiter

หญิงไทยคู่ อายุ 56 ปี อาชีพ รับจ้าง ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ

อาการสำคัญ : ปรีกษาเรื่องก้อนที่คอโตขึ้น 9 เดือน

ประวัติปัจจุบัน : 17 ปีก่อน มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ได้รับการวินิจฉัยเป็น Multi-nodular goiter ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา L-thyroxine ติดตามการรักษาและกินยาอย่างต่อเนื่องนาน 4 ปี ขนาดก้อนเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ต่อมาผู้ป่วยหยุดการรักษาเอง ไม่ได้รับการตรวจรักษานาน 10 ปี ไม่ได้กินยาใดๆ

9 เดือนก่อนมาร.พ. รู้สึกว่าก้อนที่คอเริ่มโตขึ้นเล็กน้อย ไม่มีอาการผิดปกติอื่น จึงกลับมาตรวจ แพทย์ได้เริ่มให้ยารักษาใหม่ ผู้ป่วยกินยาต่อมานานหลายเดือนก้อนไม่ยุบลง จึงลองหยุดยาเอง สังเกตเห็นว่าก้อนโตขึ้นอีกเล็กน้อย

ประวัติอดีต : ไม่มีโรคประจำตัวอื่น ไม่มียาที่กินเป็นประจำ

ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธโรคทางกรรมพันธุ์ในครอบครัว

ประวัติส่วนตัว : ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา

Physical Examination : A Thai middle-aged female, fully-conscious, co-operative

HEENT : not pale, anicterus

thyroid goiter estimated 55 grams,

prominent nodule right lobe 6 x 5.6 cm, left lobe 1.9 cm

neck circumference 33 cm.

no cervical lymphadenopathy

Heart : normal S1, S2, no murmur

Lungs : clear

Abdomen : normal, liver and spleen can't be palpated

Extremities : normal